
切い方ハソノ程度ニ色々アルガコトニー品種トシテ採リ得ル。



Chamaele decumbens f. flabellifoliolata

Chamaele decumbens Makino forma flabellitoliolata Y. Kimura f. nov.

Lamina foliorum bi-tri-pinnatisecta, segmentis primariis petiolulatis, secundariis brevipetiolulatis v. subsessilibus, ultimis subrotundatis, late rhombeis vel flabelliformibus apice profunde dentatis basi cuneatis.

Nom Jap. Ôgiba-sentôsô.

Hab. Sikoku, Prov. Awa, Myosaigun, Zinryô-mura (S. Abe. no. 40, 23 Maio 1937, no. 2 Maio 1938—Typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo.). Prov. Suruga, Huzietakakusayama (D. Schimidzu, no 118, 3 Maio 1930).

○しろばなほつつじ——草木手帖 No. 3(木村陽二郎)

草木研究會會員外山三郎氏ハ肥前國多良岳ニ於テ ほつしじノ

(×1) 白花品ヲ得ラレタ。 花瓣ハ純白デ 只表面先端ハ若イ花デハ少シ ク黄緑色ヲ帯ビル。花柱モ純白ダガ中央部ハ 稍々赤味ヲ帶ビル事ガアル。同氏ノ好意ニヨ リ昨年ハ生品ヲ見ル事ヲ得タ。 コレニレるばなほつつじノ名ヲ與ヘル。

Tripetaleia paniculata Siebold et Zuccarini in Abh. Akad. Wiss. Muench. 3 Abt. 3 (1843) 732 et 3 (1843) fig. 2.

forma albiflora Y, KIMURA, f. nov.

Petala nivea.

Nom. Jap. Sirobana-hotutuzi.

Hab. Kyûsyû, Prov. Hizen, Mt. Taradake (S. Toyama, 26 Jul. 1938—Typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo).

何當教室ノ腊葉室ニハ九州産ノほつつじトシテハ 田代安定氏明治 25 年採集多良岳ノモノ及ビ F. C. GRBATREX 氏 1929 年温泉岳採集ノモノ及ビ筆者ノ 1989 年祖母山採集ノモノヨリナカツタ。他ノ産地ノ標品ガ得ラレル事ガ望マシイ。

Oひめえごのき──草木手帖 No. 4 (木村陽二郎)

草木研究會員吉岡重夫氏ノ採集品=花モ葉モ小サナえどのきノー品種ガアル。氏=依レバ全株葉ハ皆小形トノ事デアル。コレヲひめえどのきト名付ケル、産地ハ豐前築上郡岩屋村デアル。

Stylax japonica Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 1 (1835) 53, t. 23.

forma parviflora Y. KIMURA f. nov.

Folia parva 2-3 cm longa 1—1.2 cm lata oblonga utrinque attenuata. Flores

parvi, petalis ca. 1 cm longis.

Nom. Jap. Hime-egonoki.

Hab. Kyûsyû, prov. Buzen, Tikuzyô-gun. Iwaya-mura (S. Yosioka, no. 23, 30 Maio 1937—Туриз in Herb. Univ. Imp. Tokyo.).

Berichtigung (正 誤)

Diese Zeitschr. XV. p. 466 (1939), S. 466, Zeile 9-11 von oben

- (IE) lies "Analysen-Zahlen (C 71.35 % H 7.14 %) · · · · · $C_{22}H_{26}O_5$ (ber. C 71.3 % H 7.0 %) · · · ·
- (課) statt "Analysen-Zahlen (C 66.3 % H 7.1 %)…
 - \cdots $C_{20}H_{24}O_{6}$ (ber. C 66.7 % H 6.7 %) \cdots